




IX. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

*v tradici kongresu pediatriů a dětských sester
XXVIII. dnů praktické a nemocniční pediatrie*

19.–22. 5. 2010 / Olomouc

PROGRAM

ORGANIZACE KONGRESU

Prezident kongresu

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Pořadatelé

**Česká pediatrická společnost ČLS JEP,
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc**

Ve spolupráci

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s.,
Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina věc veřejná,
Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj

Vědecký výbor

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.,
MUDr. Hana Cabrnová, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.,
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc., doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.,
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc., doc. MUDr. Hana Houštková, CSc.,
doc. MUDr. Josef Hoza, CSc., prof. MUDr. Jan Janda, CSc.,
doc. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D., prof. MUDr. László Kovács, CSc.,
MUDr. Vladimír Němec, MUDr. Jan Pajerek,
prof. MUDr. Ludmila Podracká, CSc., MUDr. Luděk Ryba,
doc. MUDr. Josef Sýkora, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Programový výbor

MUDr. Pavel Frühauf, doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.,
MUDr. Lumír Kantor, doc. PhDr. Jana Kocourková, Ph.D.,
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., MUDr. Marián Koranda,
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., MUDr. Pavel Neugebauer,
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.,
doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc.,
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.,
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., MUDr. Darina Stančíková,
doc. MUDr. Marie Staňková, CSc., prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.,
doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc.,
doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Leoš Teslík,
MUDr. Václav Vobruba, MUDr. Jitřenka Venháčová

Organizační výbor

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Josef Gut, MUDr. Jarmila Seifertová,
MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc., doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Odborný a organizační výbor sekte sester

Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D., Mgr. Jana Kameníčková,
Bc. Světlana Kašubová, Mgr. Jana Marounková

Programové zajištění

SOLEN, s. r. o., Lazecská 297/51, 779 00 Olomouc

- Mgr. Iva Daňková, tel.: 582 397 407, mob.: 777 557 411,
e-mail: dankova@solen.cz

Organizační sekretariát

SOLEN, s. r. o., Lazecská 297/51, 779 00 Olomouc

- Ing. Karla Břečková, tel.: 582 397 457, mob.: 777 714 677,
e-mail: breckova@solen.cz
- Marta Křepelová, tel.: 582 396 038, mob.: 777 557 415, fax:
582 396 099, e-mail: krepelova@solen.cz
- Mgr. Herta Mihálová, tel.: 585 209 207, mob.: 777 622 039,
e-mail: mihalova@solen.cz

Místo konání

Sekce lékařů: Hotel NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc
Sekce sester: Slovanský dům, Hynaisova 11, Olomouc

Kongresový poplatek

lékaři 1300 Kč

- členové České pediatrické společnosti a OSPDL 1100 Kč
- sestry 900 Kč
- studenti – zdarma / pouze vstup na přednášky + kongresové materiály
- při registraci na místě přírůžka + 200 Kč

Kongresový poplatek nezahrnuje:

- vstupné 100 Kč na doprovodný kulturní program ve čtvrtek 20. 5. 2010
- vstupné 200 Kč na galavečer v pátek 21. 5. 2010

STRAVOVÁNÍ

LÉKAŘSKÁ SEKCE / NH Olomouc Congress

Pro účastníky je zajištěno občerstvení během přestávek mezi jednotlivými přednáškovými bloky. Obědy pro účastníky lékařské sekce se uskuteční v prostorách tenisové haly OMEGA Sport centra, které se nachází vedle hotelu NH Olomouc Congress.

K úhradě obědů slouží stravenky, které obdrží účastníci při registraci. Obědové přestávky jsou vyznačeny v programu.



SESTERSKÁ SEKCE / Slovanský dům

Pro účastníky je zajištěno občerstvení během přestávek mezi jednotlivými přednáškovými bloky. Obědy pro účastníky sesterské sekce budou vydávány v přednáškovém sále Slovanského domu.

K úhradě obědů slouží stravenky, které obdrží účastníci při registraci. Obědové přestávky jsou vyznačeny v programu.



POZVÁNKY NA ODBORNÉ SNÍDANĚ

Pátek 21. 5. 2010/ 7.15–7.45 / Sál Olomouc

Ranní setkání společnosti Novo Nordisk

- SNÍDANĚ S EXPERTEM: Jak se žije dívkám a ženám s Turnerovým syndromem v České republice (ale ne všem – je stále mnoho pacientek, jejichž diagnóza nebyla dosud stanovena) – J. Zapletalová

Sobota 22. 5. 2010/ 7.45–8.15 / Sál Olomouc

Snídaně s firmou Pfizer:

- Pneumokoková onemocnění a nová vakcína Prevenar 13 – Z. Vančíková

DALŠÍ ODBORNÁ SETKÁNÍ

Čtvrtek 20. května: 12.30–13.30 / salonek OMEGA centrum nebo střešní terasa NH OLOMOUC CONGRESS

Tisková konference pro zástupce médií

Pátek 21. května: 12.15–14.15 / salonek OMEGA centrum nebo střešní terasa NH OLOMOUC CONGRESS

Zasedání Výboru České pediatrické společnosti

Akce je v rámci postgraduálního vzdělávání ohodnocena 30 kredity pro lékaře, 12 kredity pro sestry, porodní asistentky, nutriční terapeutky, zdravotnické záchranáře, zdravotně sociální pracovníky a 12 kredity pro klinické psychology.

OBSAH

Organizace kongresu	2
Rozpis programu v jednotlivých sálech	5
Podrobný program	8
Postery	16
Sekce sester	18
Plánek kongresových prostor	20
Doprovodný kulturní program	22
Poděkování	39
Mapka	40



ROZPIS PROGRAMU V JEDNOTLIVÝCH SÁLECH

ČTVRTEK / NH OLOMOUC CONGRESS

SÁL EVROPA

8.15

- Slavnostní zahájení

8.30–10.00

- Plenární přednášky

10.00–10.30

- Přestávka

10.30–12.30

- Psychosomatická onemocnění
garant J. Seifertová, J. Kocourková

12.30–14.00

- Oběd / Firemní sympozia

14.00–15.30

- Infektologie
garant M. Staňková, D. Sedláček

15.30–16.00

- Přestávka

16.00–17.30

- Právní a etické aspekty pediatrické péče
garant J. Slaný, L. Prudil

17.30–18.30

- Firemní sympozia

SÁL OLOMOUC

10.30–12.00

- Kardiologie
garant M. Šamánek, B. Hučín

12.00–13.30

- Oběd

13.30–15.00

- Neonatologie
garant Z. Straňák, L. Kantor

15.00–15.30

- Přestávka

15.30–17.00

- Dětská hematologie a onkologie
garant D. Pospíšilová, J. Starý

17.00–17.15

- Přestávka

17.15–18.15

- Pediatrie a ČARO
(symposium České aliance proti chronickým respiračním onemocněním)

ROZPIS PROGRAMU V JEDNOTLIVÝCH SÁLECH

PÁTEK / NH OLOMOUC CONGRESS

SÁL EVROPA

8.00–9.45

- Plenární přednášky

9.45–10.15

- Přestávka

10.15–12.15

- Adolescentní medicína
garant M. Šnajderová, L. Teslík

12.15–13.45

- Oběd / Firemní sympozia

13.45–15.45

- Gastroenterologie, hepatologie a výživa
garant O. Pozler, P. Frühauf

15.45–16.15

- Přestávka / Firemní sympozium

16.15–18.15

- Primární péče
garant H. Cabrnachová, P. Neugebauer

18.15–18.30

- Přestávka

18.30–20.00

- Workshop Molekulární biologie v pediatrii
garant M. Hajdúch, V. Mihál

SÁL OLOMOUC

7.15–7.45

- Ranní setkání společnosti Novo Nordisk

10.00–11.30

- Diabetologie
garant J. Venháčová, Z. Šumník

11.30–12.00

- Přestávka

12.00–13.30

- Neurologie
garant H. Ošlejšková, V. Komárek

13.30–14.30

- Oběd

14.30–16.00

- Endokrinologie
garant J. Zapletalová, J. Lebl

16.00–16.30

- Přestávka

16.30–18.00

- Systémová onemocnění pojiva
garant P. Doležalová, J. Hoza

18.00–18.10

- Firemní sympozia

SÁL EVROPA

8.30–10.00

- Plenární přednášky

10.00–10.15

- Přestávka

10.15–12.15

- Dětská pneumologie
garant P. Pohunek, F. Kopřiva

12.15–12.45

- Přestávka

12.45–13.45

- Dětská psychiatrie
garant D. Stančíková, M. Koranda

SÁL OLOMOUC

7.45–8.15

- Snídaně s firmou Pfizer

10.15–11.45

- Nefrologie
garant J. Janda, Z. Doležel

11.45–12.15

- Přestávka

12.15–13.45

- Intenzivní péče o děti a dorost
garant V. Vobruba, J. Wiedermann

SEKCE SESTER / SLOVANSKÝ DŮM

ČTVRTEK

9.00–10.40

- Ošetrovatelská péče v neonatologii
garant J. Fendrychová

10.40–11.00

- Přestávka

11.00–13.00

- Ošetrovatelská péče v intenzivní medicíně
garant J. Kameníčková

13.00–14.30

- Oběd

14.30–16.30

- Ošetrovatelská péče v dětské hematologii
garant S. Kašubová

PÁTEK

10.30–12.30

- Ošetrovatelská péče v primární sféře
garant J. Marouňková

12.30–14.00

- Oběd

14.00–17.00

- Právní a etické aspekty v pediatrickém ošetrovatelství
garant O. Dostál, Š. Špeciánová

Podvečerní slavnostní zahájení v Kapli Božího těla

ČTVRTEK 20. KVĚTNA

Sál Evropa

8.15 Slavnostní zahájení

8.30–10.00 Plenární přednášky

- Rotavirová infekce – nejenom epidemiologický a ekonomický problém
T. Vesikari
- Mění se alergie v měnícím se světě
V. Špičák
- Česká dětská hematologie a onkologie 1990–2010
J. Starý

10.00–10.30 Přestávka

10.30–12.30 Psychosomatická onemocnění – garant J. Seifertová, J. Kocourková

- Psychologické aspekty psychosomatických poruch
J. Kocourková
- Je psychosomatizace v ordinaci praktického dětského lékaře častá?
J. Seifertová
- Jak to vidí gastroenterolog?
O. Pozler
- Primární bolesti hlavy v neuropediatrické praxi
M. Kunčíková, M. Kvardová, H. Medřická
- Psychiatrická onemocnění s převahou somatických příznaků
J. Koutek

12.30–14.00 Oběd / Firemní sympozia

- GlaxoSmithKline jako partner v očkování pediatra:
 - Očkování proti HPV, jakou roli hraje pediatr v prevenci HPV?
J. Sláma
 - Ochrana celé rodiny proti pertussi začíná již v ordinaci pediatra
J. Smetana
- Nutricia: Novinky z výzkumu společnosti Nutricia
K. Uxová

14.00–15.30 Infektologie – garant M. Staňková, D. Sedláček

- Děti exponované viru lidské imunodeficiencie a jím infikované
H. Rozsypal, D. Jilich, M. Staňková, J. Záhumenský, M. Holub
- Drogová problematika dětí a mladistvých ve vztahu k infekčním nemocem
J. Zítová
- Závažné neuroinfekce u dětí
L. Rožnovský
- Chřipka u dětí
Z. Blechová, V. Marešová
- Klinické projevy lymeské boreliózy v dětském věku
L. Krbková
- Dětská izolační lůžka resuscitační péče pro pacienty s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými nemocemi
V. Dedek, H. Houšťková, M. Fajt, H. Roháčová, P. Camprová, M. Sádlo, L. Sedláčková, J. Havránek, P. Heinige, K. Brosch

15.30–16.00 Přestávka

16.00–17.30 Právní a etické aspekty pediatrické péče – garant J. Slaný, L. Prudil

- Některé etické problémy současné pediatrie
J. Slaný
- Aktuální etické otázky počátku lidského života: od embryonálních kmenových buněk k baby-boxům
K. Šipr, H. Šiprová
- Náhradní mateřství (vypůjčená děloha) – pohled pediatra
F. Schneiberg
- Šikana očima dětí
E. Kadlecová, M. Velemínský a kol.
- Právní a etické aspekty pediatrické péče
L. Prudil

17.30–18.30 Firemní sympozia

- Merck Sharp & Dohme IDEA
 - Kvadrivalentní vakcína v klinické praxi
J. Štěpán
 - Rotaviry – umíme je léčit a předcházet jim?
N. Szitányi
- Astellas Pharma: Antibiotické mýty a jejich racionální řešení
Z. Blechová
- MT–Maklér: Pojištění majetku a profesní odpovědnosti za škodu
P. Přidal, M. Janda

Sál Olomouc

10.30–12.00 Kardiologie – garant M. Šamánek, B. Hučín

- Péče o děti se srdeční vadou v ČR
J. Škovránek
- Pozdní následky Fontanovy cirkulace u jedinců s funkčně jedinou srdeční komorou
V. Chaloupecký, T. Tláskal, R. Gebauer, V. Tomek, O. Reich, P. Tax, H. Bartáková, P. Kubuš, J. Radvanský, J. Lisý, I. Hadačová, J. Škovránek
- Prenatální kardiologie v České republice
V. Tomek, J. Škovránek, J. Gilík, J. Marek
- Léčba srdečních vad u dětí katetrizačními intervencemi
P. Tax, O. Reich
- Kardiochirurgie v Dětském kardiocentru v Motole
B. Hučín
- Předcházet nejčastější příčině úmrtí musí pediatrii
M. Šamánek

12.00–13.30 Oběd

13.30–15.00 Neonatologie – garant Z. Straňák, L. Kantor

- Neonatologie, co nového od kongresu v Jihlavě?
L. Kantor
- Aktuální postupy u novorozenců s poruchou poporodní adaptace
Z. Straňák
- Současné možnosti chirurgické ligace otevřené tepenné dučeje u dětí s nízkou porodní hmotností v České republice
T. Matějka, P. Vojtovič, T. Tláskal, J. Škovránek, M. Černý, K. Liška, P. Huml, L. Kantor, Z. Kokštein
- Nezralý novorozenec v péči PLDD
J. Dort, E. Dortová
- Infekční onemocnění v novorozeneckém věku
J. Janota

15.00–15.30 Přestávka

15.30–17.00 Dětská hematologie a onkologie – garant D. Pospíšilová, J. Starý

- Současné možnosti diagnostiky a léčby imunitní trombocytopenické purpury u dětí
D. Pospíšilová
- Transplantace kmenových buněk krvetvorby s použitím alternativních dárců
P. Sedláček, P. Keslová, R. Formánková, L. Król, M. Matulová, A. Stetsko, P. Říha, P. Hubáček, J. Starý
- Symptomatologie a současné léčebné postupy u vybraných embryonálních nádorů (retinoblastom, hepatoblastom, nefroblastom)
J. Mališ
- Von Willebrandova nemoc v dětském věku
J. Blatný
- Osud dětí léčených pro akutní lymfoblastickou leukémií podle protokolů ALL-BFM 90 a ALL-BFM 95 – dlouhodobé sledování
P. Smíšek, J. Starý, I. Janotová, P. Gajdoš, B. Blažek, Z. Černá, J. Hak, H. Hrstková, Y. Jabali, V. Mihál, D. Procházková, J. Štěrba
- Metronomická léčba v dětské onkologii jako nová léčebná metoda
D. Bronišová, P. Múdry, V. Bajčiová, D. Valík, L. Dubská, P. Mazánek, K. Zitterbart, Z. Pavelka, L. Deák, N. Andre, J. Štěrba

17.00–17.15 Přestávka

17.15–18.15 Pediatrie a ČARO (symposium České aliance proti chronickým respiračním onemocněním)

- ČARO – jeho vznik a cíle
V. Kolek
- Pediatrický program GARD – chronická onemocnění horních cest dýchacích
V. Špičák
- Chronická respirační onemocnění u dětí
F. Kopřiva



Sál Evropa

8.00–9.45 Plenární přednášky

- Pediatrics in Germany 2010
H. Böele
- eLearningový portál Slovenskej lekárskej komory
D. Meško, M. Dragula, M. Jurigová, M. Turček
- Předání Brdlíkovy ceny za celoživotní přínos české pediatrii a předání Ceny České pediatrické společnosti za vědeckou činnost

9.45–10.15 Přestávka

10.15–12.15 Adolescentní medicína – garant M. Šnajderová, L. Teslík

- Hormonální kontraceptiva u adolescentních dívek
M. Šnajderová
- Hormonální antikoncepce v ambulanci dětského gynekologa
L. Teslík
- Vrozené trombofilní dispozice a hormonální antikoncepce
I. Hadačová
- Hormonální kontraceptiva v dermatologii
H. Korandová
- Náplň a provádění preventivních prohlídek u adolescentů, zkušenosti s HAK v ambulanci PLDD
H. Cabrnachová
- Naše zkušenosti s tromboembolickou chorobou u adolescentních dívek s hormonální antikoncepcí
D. Pospíšilová

12.15–13.45 Oběd / Firemní sympozia

- Hamé
- HiPP
 - Význam prebiotik a probiotik v kojenecké výživě
P. Frühauf
 - Nová mléčná kojenecká výživa HiPP
H. Bujnová
- IPSEN PHARMA: Nové trendy v léčbě zácpy u dětí a adolescentů
J. Nevoral

13.45–15.45 Gastroenterologie, hepatologie a výživa – garant O. Pozler, P. Frühauf

- Ikterus novorozenců a kojenců
R. Kotalová
- Racionální indikace probiotik
J. Nevoral
- Cílený screening celiakie
P. Frühauf
- Nespecifické střevní záněty – diagnostika a terapie
O. Pozler

15.45–16.15 Přestávka / Firemní sympozium

- Nestlé: Vliv bakteriálního osídlení na rozvoj obezity
P. Frühauf

16.15–18.15 Primární péče – garant H. Cabrnachová, P. Neugebauer

- Očkování dětské populace v ČR v roce 2010
H. Cabrnachová
- Nová doporučení v oblasti nepovinných očkování, aktuální informace o očkovacích látkách
R. Chlábek
- Syndrom náhlého úmrtí kojence v roce 2010
H. Houšťková

- Kraniosynostózy a deformity neurokrania – pediatrické minimum
H. Krásničanová
- Hodnocení stavu výživy v pediatrii – kritéria eutrofie, podváhy, dystrofie, nadváhy a obezity
H. Krásničanová
- Děti s porodní hmotností pod 1500g vyšetřené v rizikové poradně v 5 letech věku
M. Kašparová, P. Kašpar, B. Fišárková, M. Nečasová
- WHO studie některých antropologických údajů sedmiletých dětí
B. Procházka
- Hyperkinetická porucha u dětí
M. Hrdlička

18.15–18.30 Přestávka

18.30–20.00 Workshop Molekulární biologie v pediatrii – garant M. Hajdúch, V. Mihál

- Molekulární technologie v medicíně
A. Bóday
- Mnohočetná léková rezistence
F. Kopřiva
- DNA microarrays
J. Srovnal
- Molekulárně biologické aspekty anémií
D. Pospíšilová
- Molekulární biologie solidních nádorů dětského věku
T. Eckschlager, A. Vícha
- Klinický význam prognostických znaků v léčbě dětských leukémií
V. Mihál

Sál Olomouc

7.15–7.45 Ranní setkání společnosti Novo Nordisk

- SNIDANÉ S EXPERTEM: Jak se žije dívkám a ženám s Turnerovým syndromem v České republice (ale ne všem – je stále mnoho pacientek, jejichž diagnóza nebyla dosud stanovena)
J. Zapletalová

10.00–11.30 Diabetologie – garant J. Venháčová, Z. Šumník

- Viry v patogenezi prediabetické autoimunity – které, proč a jak
O. Cinek, G. Tapia, K. S. Ronningen
- Léčba dětského diabetu v Evropě a u nás: projekt SWEET
Z. Šumník, O. Cinek, J. Lebl, T. Danne
- Inzulínové pumpy u dětí
J. Škvor
- Kontinuální monitorace glukózy – možnosti a přínos v léčbě dětí s diabetes mellitus
J. Venháčová, P. Venháčová
- Co přináší diagnostika monogenního diabetu dětským pacientům?
J. Lebl, Š. Průhová, P. Dušátková, Z. Šumník, S. Koloušková, M. Šnajderová, O. Cinek

11.30–12.00 Přestávka

12.00–13.30 Neurologie – garant H. Ošlejšková, V. Komárek

- Co je podstatné a co nové v dětské epileptologii?
V. Komárek
- Neepileptické záchvaty: nejčastější omyly v diferenciální diagnostice epileptických záchvatů
H. Ošlejšková
- Multidisciplinární management neurovývojových poruch
H. Ošlejšková, P. Cahová, P. Pejčochová
- EEG a zobrazovací metody u neurovývojových onemocnění
V. Komárek

- Náhlá a neočekávaná ohrožení života v dětské neurologii
V. Komárek
- Projekt časné diagnostiky Pompeho nemoci u vysoce rizikové populace dětí a mladistvých v ČR
H. Ošlejšková, Š. Rusňáková, S. Voháňka

13.30–14.30 Oběd

14.30–16.00 Endokrinologie – garant J. Zapletalová, J. Lebl

- Poruchy pohlavního vývoje
J. Zapletalová, R. Pomahačová, I. Plášilová, J. Lebl
- Záhada vegetariánské dívky
J. Zapletalová, K. Michálková
- Záhada hubnoucí dívky
I. Plášilová, O. Pozler
- Záhada pomočeného chlapce
R. Pomahačová
- Záhada jednovaječných dvojčat
J. Lebl

16.00–16.30 Přestávka

16.30–18.00 Systémová onemocnění pojiva – garant P. Doležalová, J. Hoza

- Diferenciální diagnostika artritidy v dětském věku
P. Doležalová, D. Němcová, J. Hoza
- Etanercept v léčbě JIA – naše zkušenosti
D. Němcová, P. Doležalová, M. Macků, J. Hoza
- Metotrexát v léčbě juvenilní idiopatické artritidy: klinická doporučení
J. Tuková, P. Doležalová, D. Němcová, J. Hoza
- Extraartikulární projevy revmatických onemocnění u dětí
M. Macků, J. Fráňová, M. Schiller

18.00–18.10 Firemní sympozia

- Medindex – Způsob léčby akutních zánětů dýchacích cest provázených kašlem a léčba chronických bronchitid
I. Šulc



Sál Evropa

8.30–10.00 Plenární přednášky

- Obezita a metabolický syndróm u dětí a adolescentov
L. Kovács
- Úloha vrodenej imunity v patogenéze infekcií močových ciest
Ľ. Podracká
- Pediatrie 21. století: technologie versus nemocné dítě
J. Feber, P. Geier

10.00–10.15 Přestávka

10.15–12.15 Dětská pneumologie – garant P. Pohunek, F. Kopřiva

- Vývoj epidemiologických ukazatelů a dat o závažnosti dětského astmatu ve světě a v ČR
P. Pohunek, T. Svobodová
- Genetika astmatu a její význam v pediatrické praxi
F. Kopřiva
- Zánět dýchacích cest u dětských respiračních onemocnění a jeho neinvazivní vyšetřování
J. Chládková
- Obtížně léčitelné astma u dětí a možnost jeho cílené léčby
T. Svobodová, K. Urbanová, J. Uhlík, V. Povýšilová, P. Pohunek
- Ciliární dyskineze – jak se může stará známá nemoc změnit v novou výzvu
J. Djakow, T. Svobodová, J. Uhlík, O. Cínek, P. Pohunek
- Diferenciální diagnostika dušnosti při tělesné námaze
P. Basek

12.15–12.45 Přestávka

12.45–13.45 Dětská psychiatrie – garant D. Stančíková, M. Koranda

- Dítě, rodič a návykové látky
I. Preslová
- Možnosti terapeutické práce s dospívajícími problémovými uživateli drog (Model pracoviště CESTA Řevnice)
I. Platz
- Specifika adiktologické péče u dětí a mladistvých uživatelů drog
M. Koranda
- Zneužívání psychotropných látek u dětí a dospívajících v Slovenskej republike
J. Kresánek, K. Furková, S. Plačková, B. Cagaňová

Sál Olomouc

7.45–8.15 Snídaně s firmou Pfizer:

- Pneumokoková onemocnění a nová vakcína Prevenar 13
Z. Vančíková

10.15–11.45 Nefrologie – garant J. Janda, Z. Doležel

- Polyurie a polydipsie
Z. Doležel, J. Štarha, D. Dostálková
- Co je nového v diagnostice a léčbě infekce močových cest, doporučení pro praxi
J. Janda
- AASI (Ambulatory Arterial Stiffness Index) a pulzní tlak u dětí s diabetes mellitus 1. typu (DMT1)
T. Šuláková, J. Janda, J. Černá, V. Janštová, J. Feber
- Evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze u dětí a adolescentů
T. Seeman

11.45–12.15 Přestávka

12.15–13.45 Intenzivní péče o děti a dorost – garant V. Vobruba, J. Wiedermann

- Dětská intenzivní medicína v ČR v roce 2010
J. Kobr, V. Vobruba
- Program umělé plicní ventilace v domácí péči v České republice
K. Dlask, D. Blažek, P. Pavlíček
- Polytrauma u dětí – urgentní ošetření a zajištění
M. Prchlík
- Mírné traumatické poranění mozku
J. Wiedermann, V. Smolka, E. Klásková, D. Aleksijevič, J. Zapletalová
- Respirační selhání
M. Fedora, J. Žurek
- Učíme rodiče křísit! Kurz základů resuscitace pro rodiče
L. Doležalová, L. Ryba, H. Lžíčarová, H. Nádvorníková, P. Šenková



Sekce diagnostika – moderátor M. Hladík

7.45–8.30

- Nefrologické a urologické komplikace u Kawasakiho nemoci
J. Gut, L. Kocinová, Š. Kučerová, J. Popelka
- Kdo uvěří?
L. Ryba, R. Stiskálková, M. Janků
- Výsledky zátěžového testu s BH4 u 18 HPA/PKU pacientů a korelace s genotypem
D. Procházková, S. Pouchlá, P. Konečná, H. Vinohradská, J. Jágerová, Z. Doležel
- Pylorostenóza a gastroezofageální reflux (GER) – úskalí sonografické diagnostiky
J. Zikmund
- Gastrointestinální hormony a diabetes mellitus typu 1 v dětském věku
M. Huml, J. Sýkora, J. Varvařovská, K. Siala, R. Pomahačová, M. Karlíková, J. Kobr
- Děti v českém registru renálních biopsií 1994–2008, 15 let zkušeností
A. Kolský, E. Jančova, J. Dušek, M. Hladík, S. Skálová, K. Vondrák, P. Geier, V. Smrčka, J. Štarha, Z. Pellantová, J. Skibová, J. Stejskal, J. Janda, I. Rychlík, V. Tesař et al.
- Překvapující pozitivní účinek desmopresinu s nootropikem u dětí s rezistentní enuresis nocturna
J. Liška, V. Holeček, Š. Sobotová, B. Čuláková, M. Kepková
- Kvantitativní stanovení hladiny hepcidinu v krvi a moči u dětských pacientů s nespecifickými střevními záněty metodou ELISA a pomocí hmotnostní spektrometrie
J. Houda, P. Džubák, B. Ludíková, O. Pzler, D. Pospíšilová
- Měření dávky ionizujícího záření při CT vyšetření dětí a možnosti jejího snižování
S. Tůma, K. Daničková, P. Závada, M. Polovinčák, M. Roček
- Inflamometria a její význam v manažmente detskej astmy
M. Jeseňák, E. Babušíková, Z. Havlíčková, J. Kryštofová, T. Turčan, Z. Michnová, Z. Rennerová, M. Barreto, P. Bánovčin
- Invazivní pneumokokové infekce na JIRP DK FN Plzeň v letech 2007–2009
J. Fremuth, J. Kobr, K. Pizingerová, L. Šašek
- Význam hypersignálních ložisek v T2 vážených obrazech na MRI vyšetření mozku pro stanovení diagnózy neurofibromatosis von Recklinghausen typ 1
B. Petrák, J. Lisý, M. Kalužová, J. Kraus
- Nová varianta diagnózy phacomatosis pigmentokeratotic
B. Petrák, Š. Čapková, K. Bláhová, D. Kodetová, V. Skalická, J. Lisý, J. Mališ, M. Kalužová
- Monogenní hypertenze
Z. Doležel, D. Dostálková, J. Štarha
- Efektivita novorozeneckého screeningu v České republice
F. Votava, V. Kožich, S. Šťastná, P. Chrástina, T. Adam, D. Friedecký, H. Vinohradská, P. Kračmar, M. Balaščíková, T. Piskáčková, M. Macek Jr., R. Gaillyová, Z. Švagera

Sekce hematoonkologie – moderátorka H. Hrstková

- Některé funkční parametry plic u pacientů po onkologické léčbě
H. Hrstková, J. Šťastná, I. Tomášková, Z. Nováková, N. Honzíková
- Závažné komplikace v průběhu imunitní trombocytopenické purpury u adolescentních dívek
B. Ludíková, D. Pospíšilová, Z. Novák, I. Stejskalová, J. Houda
- Příklad komplikovaného průběhu akutní formy ITP
L. Doležalová, Z. Černá, J. Kobr, T. Votava
- Klinický přínos molekulární genetické analýzy Rb1 genu u dětí s retinoblastomem
T. Kepák, I. Valášková, J. Mališ, J. Zrůstová, V. Peňasová, K. Šenková, R. Autrata, R. Gaillyová, J. Štěrba

- Sarkomy u dětí a mladých dospělých
P. Múdry
- Současný výskyt neonatální aloimunitní trombocytopenie a Wiskottova-Aldrichova syndromu u novorozence
L. Sulovská, D. Pospíšilová, B. Ravčuková, T. Freiburger
- Použití betablokátorů v léčbě problematických hemangiomů – první zkušenosti
S. Cyprová, J. Mališ, M. Ganevová, V. Stará, M. Kynčl, J. Starý

Sekce kazuistiky – moderátor J. Gut

13.45–14.30

- Epulis congenitus – vzácný nádor novorozeneckého věku
Z. Doležel, D. Wechsler, D. Janeček
- Raritní příčiny nálezu zánětlivých změn v mozkomíšním moku
P. Heinige, M. Fajt, V. Dedek, M. Sádlo, J. Pohl, J. Havránek
- Viacpočetné mikroabscesy v slezine u 2-mesačního kojence
Z. Havlíčková, M. Jeseňák, J. Mikler, L. Zúbriková, P. Bánovčin
- Raritní případ kongenitální hypoplázie kostí pravej hornej končatiny s apláziou pravého laktového klbu
I. Kušnerová
- Překvapivá(?) možná příčina bolesti na hrudníku u dívky s epilepsií a non-compliance
K. Bouchalová, M. Neklanová, E. Karásková, V. Mihál
- Klub dvojčat a vícčrat Olomouc
Z. Starošítková, P. Tenglerová
- Ibandronát v léčbě osteoporózy u dorostence
Š. Kutílek, I. Plášilová, V. Němec
- Trombóza renální žíly s plicní embolizací jako první příznak lupusové nefritidy
S. Skálová, L. Minxová, A. Lukeš, P. Dědek, M. Podhola



ČTVRTEK 20. KVĚTNA

9.00–10.40 Ošetrovatelská péče v neonatologii – garant J. Fendrychová

- Bezpečnost ošetrovatelských postupů v péči o novorozence
J. Fendrychová
- Etické a právní aspekty v péči o nemocného novorozence
J. Saxlová
- Moderní trendy v ošetrovatelské péči o fyziologického novorozence
A. Machová, I. Brabcová
- Když zhasne nejkrásnější hvězdička
V. Břízová, A. Stejskalová
- Úloha sestry v prevenci intraventrikulární hemorágie u extrémně nezrelých novorozenců
G. Magyarová, K. Demová, F. Bauer
- Retinopatie nedonošených dětí
M. Hübllová, M. Tichá
- Aliancia NNN pre rizikových novorodencov
M. Boledovičová, E. Krištofová
- Sympozium Nestlé: Probiotika v kojenecké výživě – S. Legnerová

10.40–11.00 Přestávka

11.00–13.00 Ošetrovatelská péče v intenzivní medicíně – garant J. Kameníčková

- Sympozium GlaxoSmithKline: EUNIO – internetové vzdělávání – Lekce o vakcinaci
- Kazuistika o dítěti s traumatickou amputací končetin
L. Novotná
- Polytrauma u dětí
S. Guštárová
- Domácí umělá plicní ventilace u dítěte s glykogenózou II. typu
Z. Bantová
- Historie resuscitace
J. Kameníčková
- Rok se Sašou – transversální léze míšní
D. Čečilová, M. Pecková, R. Sedláčková
- Sympozium MARK DISTRI: Čaj pro kojící matky prokazatelně ovlivňuje nástup laktace a poporodní adaptaci dítěte
O. Zelenka

13.00–14.30 Oběd

14.30–16.30 Ošetrovatelská péče v dětské hematologii – garant S. Kašubová

- Sympozium NUTRICIA: Novinky z výzkumu společnosti Nutricia
K. Uxová
- Použití podkožních venózních portů
L. Červinková
- Specifika u jednotlivých typů transplantací krevtvořné tkáně na Klinice dětské onkologie FN Brno
A. Jankovičová, D. Schwetzová
- Život s hemofilií
H. Činčilová
- Krvácivé komplikace gynekologického původu u dívek s idiopatickou trombocytopenickou purpurou – kazuistiky
L. Frélichová, H. Nemerádová, J. Vlčková
- Trombocytopenie
M. Schinerová, E. Hůlková, M. Hrebenarová
- Dětská izolační lůžka resuscitační péče pro pacienty s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými nemocemi
L. Sedláčková, V. Dedek, P. Camprova

10.30–12.30 Ošetrovatelská péče v primární sféře – garant J. Marounková

- Kompetence dětských sester v primární péči
J. Marounková
- Lékařská služba první pomoci – součást Pracoviště dětské medicíny
J. Uhlířová
- Domácí umělá plicní ventilace u pediatrických pacientů
J. Šířová
- Epizodní záznamníky kardiologických obtíží
R. Vorbová
- Diagnostika a léčba vývojového vykloubení kyčelních kloubů
J. Škapová, L. Hanžlová
- Diagnostika nervového systému (dlouhodobé video EEG, noční polysomnografie)
L. Drbalová, M. Dvořákova
- Sympozium HiPP: Nová mléčná výživa HiPP
H. Bujnová

12.30–14.00 Oběd

14.00–17.00 Právní a etické aspekty v pediatrickém ošetrovatelství – garant O. Dostál, Š. Špeciánová


- Kompetence studentů lékařských fakult Univerzity Karlovy k prevenci syndromu sexuálního zneužívání dětí
J. Hanušová
- Právní úprava ochrany dětí před týráním, zneužíváním či zanedbáváním ze strany zdravotníků
Š. Špeciánová
- Informovaný souhlas v pediatrické praxi, povinná a dobrovolná očkování, ochrana práv nezletilých a rozhodování zákonných zástupců
O. Dostál
- Zdravotnická dokumentace a povinná mlčenlivost, oznamovací povinnost zdravotníka
L. Kotyzová
- Právní odpovědnost sester, nový Trestní zákon, právní ochrana zdravotníka
Š. Holub
- Realizace práv dětských pacientů v klinické praxi
E. Zacharová
- Kulturní kompetence sestry – posouzení dětí z minorit
D. Nováková

Výstavní prostory

IX. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

v tradici KONGRESU PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER - XXVIII. dnů praktické a nemocniční pediatrie

NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc, 19. - 22. 5. 2010



VÝSTAVNÍ PLOCHA

- 1 GlaxoSmithKline, s.r.o.
- 2 Nutricia a.s.
- 3 Novo Nordisk s.r.o.
- 4 Nestlé Česko s.r.o.
- 5 Pharma Agency, s.r.o.
- 6 Hipp Czech s.r.o.
- 7 Hamé s.r.o.
- 8 Abbott Laboratories, s.r.o.
- 9 Beiersdorf spol. s r.o.
- 10 Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
- 11 MEDAC, spol. s r.o.
- 12 BAXTER CZECH spol. s r.o.
- 13 HERO CZECH s.r.o.
- 14 Pfizer, spol. s r.o.
- 15 BAYER s.r.o.
- 16 Astellas Pharma s.r.o.
- 17 LIFTEC CZ spol. s r.o.
- 18 Generica, spol. s r.o.
- 19 SPIRIG Eastern a.s.
- 20 Grifols s.r.o.
- 21 Medindex, spol. s r.o.
- 22 Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., organizační složka
- 23 Novartis s.r.o.
- 24 ELI LILLY ČR, s.r.o.
- 25 Merck Pharma k.s., divize Merck Serono
- 26 IPSEN PHARMA, organizační složka
- 27 QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o.
- 28 Taktika, s.r.o.
- 29 Zentiva, k.s.
- 30 BIOVIT IMPEX CO.ČR, s.r.o.
- 31 APOGEPHA Arzneimittel GmbH
- 32 AGS sport, spol. s r.o.
- 33 Portál, s.r.o.
- 34 Ceumed s.r.o.
- 35 MARK DISTRI, spol. s r.o.
- 38 ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF
- 39 TIMEScz s.r.o.
- 40 GOLDIM spol.s r.o.
- 41 ASP CZECH s.r.o.
- 43 Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
- 44 Nutricia a.s. (Advanced Medical Nutrition)
- 45 R-MARK s.r.o
- 46 Občanské sdružení Výživa dětí
- 47 Danone a.s.
- 48 Sdružení celiaků České republiky
- 49 MTMakléř, s.r.o.

DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM ČTVRTEK 20. 5. 2010

Komentovaná prohlídka historického centra města Olomouce

Olomouc, dnešní stotisícové město ležící v srdci Hané, patří a odedávna patřila k nejvýznamnějším moravským městům. Brzy si připomeneme významné výročí - od prvních doložených zmínek o městě uplynulo již téměř tisíc let. Uplynulé milénium vtisklo historickému centru jedinečnou atmosféru, kterou dokládá množství překrásných památek. Po seznámení s těmi nejvýznamnějšími bude prohlídka ukončena návštěvou vyhlášené olomoucké hospůdky, kde se účastníci mohou osvěžit tradičním pěnivým mokem.

Sraz před NH Olomouc Congress: 16.45 hod.



Prohlídka zámku Náměšť na Hané

Zámek nechal vystavět hrabě Ferdinand Bonaventura Harrach v letech 1760-1763. Patrová hlavní budova s typickou mansardovou střechou a vikýři nese jednoznačné rysy ovlivnění soudobou francouzskou architekturou. Z vybavení přitahují největší pozornost návštěvníků honosné kočáry ze sbírek olomouckého arcibiskupství. Prohlídka zahrnuje návštěvu reprezentačních sálů, obytných místností a arcibiskupských kočárů. Doprava je zajištěna od místa konání kongresu k zámku a zpět.

Odjezd autobusu od NH Olomouc Congress: 17.15 hod.



Komentovaná kostýmovaná prohlídka hradu Šternberk s divadelními ukázkami

Hrad Šternberk, původně obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce, láká návštěvníky nevšední atmosférou. Půvabné kulisy hradu potom tvoří okolní lesopark a dnešní podhradí. Prohlídka zahrnuje prostory kaple, chodby a pokojů 1. patra vybavené mobiliářem posledních majitelů.

Odjezd autobusu od NH Olomouc Congress: 17.00 hod.



Komentovaná prohlídka Pivovaru LITOVEL ukončená ochutnávkou piva

Královské pivo Litovel, značka, kterou se Pivovar Litovel prezentuje na tuzemském i zahraničním trhu, má výjimečnou kvalitu, která byla v minulosti i v posledním období několikrát vysoce oceněna odborníky z oboru pivovarnictví na nejprestižnějších výstavách a soutěžích.

Odjezd autobusu od NH Olomouc Congress: 16.45 hod.

Dodržujte, prosím, časy odjezdů. Přistavené autobusy budou zřetelně označeny jednotlivými výlety.



SLAVNOSTNÍ GALAVEČER tenisová hala OMEGA / pátek 21. 5. 2010

Slavnostní galavečer pořádaný u příležitosti kongresu se koná v budově OMEGA Sport centra vedle hotelu NH Olomouc Congress.

Součástí večera bude koncert Miroslava Žbirky s kapelou, občerstvení formou rautu a volná zábava s živou kapelou.

Pouze pro účastníky s předem zakoupenou vstupenkou.





Až jednou budu velký...

Takto začíná většina dětí větu,
v níž vyjadřuje své touhy a sny.

...pomozme jim vyrůst!

U pediatrických pacientů
je **HUMATROPE** indikován¹:

- porucha růstu v souvislosti s nedostatkem **SHOX** (potvrzeným analýzou DNA)
- poruchy růstu následkem nedostatečné sekrece normálního endogenního růstového hormonu
- malý vzrůst u dětí s Turnerovým syndromem (prokázaným chromosomální analýzou)
- růstová retardace u prepubertálních dětí s chronickou renální insuficiencí
- nízký vzrůst dětí, které se narodily malé vzhledem ke svému gestačnímu věku
 - SGA/IUGR, s porodní hmotností a/nebo délkou <2 SO, které se za svými vrstevníky opoždějí v růstu do věku 4 roků nebo později

Reference: 1. SPC Humatrope.



ZKRÁCENÝ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV PŘÍPRAVKU: Humatrope 18 IU (6 mg); 36 IU (12 mg); 72 IU (24 mg) zásobní vložky. **INDIKACE:** Dlouhodobá léčba dětí s nedostatkem růstového hormonu, léčba malé postavy dětí s cytogeneticky prokázaným Turnerovým syndromem, léčba poruch růstu u pacientů s deficitem genu SHOX potvrzeným analýzou DNA, léčba růstové retardace u prepubertálních dětí s chronickou renální nedostatečností, dlouhodobá léčba malého vzrůstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk a u kterých nedošlo k růstovému výšvihu do věku 2 let. Léčba dospělých s výrazným nedostatkem růstového hormonu, potvrzeným ve dvou různých dynamických testech za současného splnění dalších kritérií. **DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ:** Humatrope v zásobní vložce je po rozpuštění aplikován podkožně. Pediatřičtí nemocní s deficitem růstového hormonu: Doporučená dávka 0,5 IU (0,17 mg)/kg tělesné váhy na týden v podkožní nebo intramuskulární injekci, rozdělená do 6 až 7 injekcí. Dospělí nemocní s deficitem růstového hormonu: Doporučená dávka na začátku léčby je 0,125 IU (0,042 mg)/kg tělesné váhy na týden v podkožních injekcích. Tato dávka může být postupně zvyšována podle individuálních potřeb pacienta na maximální dávku 0,25 IU (0,084 mg)/kg/týden. Nemocní s Turnerovým syndromem: Doporučená dávka je od 0,5 do 1,125 IU (0,17 – 0,375 mg)/kg/týden, rozdělená do 6 až 7 denních podkožních injekcí, aplikovaných nejlépe večer. Prepubertální pediatřičtí nemocní s chronickou renální nedostatečností: Doporučená dávka je přibližně 0,14 IU (0,045 – 0,050 mg)/kg/den v podkožní injekci. Pediatřičtí pacienti s deficitem genu SHOX: Doporučená dávka je 0,045 – 0,050 mg/kg/den v podkožní injekci. Pediatřičtí nemocní, kteří se narodili malí na svůj gestační věk: Doporučená dávka je 0,2 IU (0,067 mg)/kg/den v podkožní injekci. Dávkování a způsob podání by měl být individuální. Místa vpichu podkožních injekcí by měla být měněna, aby se předešlo tukové atrofii v místě vpichu. **KONTRAINDIKACE:** Známky nádorového bujení, neukončená protinádorová léčba intrakraniálního nádoru, podávání v léčbě malého vzrůstu u dětí po uzavření růstových štěrbin, akutní kritický stav po operaci na otevřeném srdci, po nitrobrříšní operaci, po mnohočetných zraněních nebo u pacientů s akutní dušností. Použití diluentu při přecitlivělosti pacienta na glycerol nebo metakresol. **ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Léčbu by měli vykonávat pouze lékaři s dostatečnými zkušenostmi. U pacientů léčených růstovým hormonem v dětství by neměly být překračovány doporučené dávky kvůli riziku akromegalie, hyperglykemie a glykosurie a po uzavření růstových štěrbin musí být pro další léčbu znovu potvrzen deficit růstového hormonu. Nemocní se sekundárním deficitem růstového hormonu způsobeným intrakraniálním nádorem by měli být často vyšetřováni pro jeho možnou progresi nebo rekurenci. Vážná nebo opakující se bolest hlavy, zrakové problémy, nevolnost a zvracení je důvodem k vyloučení edému papily a případnému vysazení léčby. Během léčby růstovým hormonem může dojít k hypotyreóze, epifyzeolýze v oblasti velkých kloubů, po intramuskulární injekci může dojít k hypoglykémii. Není dostatek zkušeností s léčbou pacientů starších 60 let a s dlouhotrvající léčbou dospělých. U léčených pacientů v kritickém stavu by měl být zvážen poměr výhod a rizik při pokračování léčby růstovým hormonem. U pacientů s poruchou růstu a syndromem Prader-Willy by měl být před zahájením léčby zvážen poměr přínosu a rizika léčby. Zahájení léčby přípravkem Humatrope u dětí s deficitem genu SHOX ve věku blízkém se pubertě se pro omezené zkušenosti nedoporučuje. Humatrope nemá účinek na schopnost řízení motorových vozidel či obsluhu strojů. **NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:** U pediatrických pacientů s deficiencí růstového hormonu vývoj protilátek proti růstovému hormonu (2 – 8 % pacientů podle výše užité dávky) Zřídka bolest a mírný přechodný otok v místě vpichu. U malého počtu dětí, léčených růstovým hormonem z lidských hypofýz (Somatropem a Humatropem), došlo k vývinu leukemie. Vztah mezi leukemií a léčbou růstovým hormonem je nejistý. Vzácně benigní intrakraniální hypertenze. U dospělých nemocných otoky (místní nebo celkové), bolesti a onemocnění kloubů, bolesti svalů, parestézie a hypertenze. Akutní předávkování by mohlo vést k hypoglykémii a následně hyperglykémii. Dlouhodobé předávkování by se mohlo projevit obrazem akromegalie. **INTERAKCE:** Lidský růstový hormon může indukovat stav rezistence k inzulinu. Nemocní s diabetes mellitus by měli být během léčby Humatropem pečlivě monitorováni. Může dojít k nutnosti úpravy dávek inzulinu. U nemocných se současnou deficiencí ACTH by měla být pečlivě zvolena substituční dávka glukokortikoidů, aby se předešlo jejich inhibičnímu účinku na růst. U žen užívajících estrogenovou substituci může být zapotřebí zvýšení dávek růstového hormonu. **TĚHOTENTSVÍ A KOJENÍ:** Humatrope by měl být podán těhotným ženám pouze v případě nezbytnosti, kojícím matkám s opatrností. **BALENÍ, VÝDEJ A UCHOVÁVÁNÍ:** Humatrope náplně obsahují buď 6 mg, 12 mg nebo 24 mg somatropinum biosyntheticum (ekvivalent 18, 36 nebo 72 IU somatropinu). Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis a lék je hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Uchovávejte při teplotě mezi 2 a 8°C. Zabráňte zmrazení diluentu a rekonstituovaného léku. Při teplotě 2 – 8 °C je balení zásobní vložky a diluentu stabilní 3 roky, rekonstituovaný lék v náplních pak 28 dní. **DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ:** Eli Lilly ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, ČR, registrační číslo a datum poslední revize textu: 56/158/89-A/C; 27. 11. 2007. Před předepsáním se prosím seznamte s úplným zněním souhrnu údajů o přípravku. Úplné znění souhrnu údajů o přípravku obdržíte na adrese: ELI LILLY ČR, s. r. o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, tel.: 234 664 111, fax: 234 664 891.

Zkrácená informace:

Složení: 1 tbl. obd. Mictonetten® obsahuje 5 mg propiverin-hydrochloridu. **Indi-**

kace: Symptomatická léčba močové inkontinence, nutkání na močení a zvýšené frekvence močení u dětí a mladistvých, kteří trpí buď hyperaktivním močovým měchýřem nebo hyperreflexií detrusoru. **Dávkování a**

způsob podání: 2 x denně (po 12 hodinách) průměrně 0,4 mg propiverin-hydrochloridu/kg hmotnosti. **Kontra-**

indikace: Přecitlivělost na léčivou či pomocnou látku. Obstrukce střeva, obstrukce močových cest s rizikem vzniku retence moči, myasthenia gravis, intestinální atonie, těžká colitis ulcerosa, toxický megacolon, nekontrolovaný glaukom s uzavřeným úhlem, střední nebo těžké poruchy jater, tachyarytmie. **Nežádoucí účinky:**

Velmi časté: sucho v ústech. Časté: poruchy akomodace, únava, bolesti hlavy, bolesti břicha a dyspepsie, obstipace. Méně časté: nauzea, závrať, tremor, retence moči, poruchy chuti, snížený krevní tlak. Vzácné: vyrážka. Velmi vzácné: palpitace, neklid. Nežádoucí účinky jsou přechodné a reverzibilní.

Interakce: Zesílení účinků při současném podávání tricyklických antidepresiv, trankvilizérů, anticholinergik, amantandinu, neuroleptik a beta-sympatomimetik. Oslabení účinku při současném podávání cholinergik. **Upo-**

zornění: Možné poruchy akomodace mohou ovlivnit reakční schopnosti. **Balení:**

Mictonetten® 30, 50 a 100 tbl.

Držitel rozhodnutí o registraci: APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Kyffhäuserstrasse 27, 01309 Drážďany, SRN. RČ: 73/128/90-C.

Datum poslední revize


textu: 11. 6. 2008. Pouze na

lékařský předpis. **Úhrada**

v ČR: Balení Mictonetten® 30, 50 a 100 tbl. jsou hrazena plně. Podrobné informace jsou obsaženy v Souhrnu údajů o přípravku a v příbalové informaci.

Mictonetten®

Léčivá látka: Propiverini hydrochloridum



**... aby se mohly v klidu věnovat
svým dětským hrám!**

APOGEPHA


MULTIVITAMIN PRO DĚTI S MINERÁLY A ACTIVINEM

CALIBRUM[®] junior



Užívání Calibra Junior
doporučuje
Česká pediatrická
společnost ČLS JEP.

-  Tabletky ve formě rybiček
s jahodovou příchutí.
-  Určeno pro děti od 3 do 12 let.
-  Obsahuje xylitol, který pomáhá
předcházet vzniku zubního kazu.
-  Na trhu balení 30 a 100 tablet.



Doplněk stravy.

Duomox[®]

Příjemný amoxicilin¹

cílená léčba komunitních infekcí²

1) Mandarinkovo-vanilková příchutí viz. SPC přípravku Duomox, 2) Prakt. Lék., 83, 2003, No. 9, p. 502-515



 **astellas**
Leading Light for Life

ASTELLAS PHARMA s.r.o.

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Zkrácená informace o přípravku DUOMOX[®] tablety:

Amoxicillinum 250, 375, 500, 750, 1000 mg. **Indikační skupina:** Baktericidní antibiotikum s širokým spektrem působnosti. Patří do skupiny penicilinů.

Indikace: Amoxicilin je lékem první volby pro empirickou léčbu akutní otitis media, akutní sinusitis a akutní exacerbaci chronické bronchitis v komunitě.

Další indikace: infekce způsobené mikroorganismy, které jsou citlivé k amoxicilinu, jako: některé jiné infekce dýchacích cest, infekce urogenitálního traktu, infekce gastrointestinálního traktu, infekce kůže a měkkých tkání. **Dávkování:** dospělí a děti nad 40 kg: 500 mg každých 8 hodin; děti 21–40 kg: 375 mg každých 8 hodin; Děti 14–20 kg: 250 mg každých 8 hodin. U závažných infekcí lze u dospělých dávkou zvýšit až na 750–1000 mg každých 8 hodin. Léčba musí pokračovat 3–4 dny po vymizení klinických příznaků. **Způsob podání:** DUOMOX[®] se může brát před jídlem, během jídla nebo po jídle. DUOMOX[®] tablety se mohou polykat celé a zapíjet vodou. Také je možné je rozpustit nejméně ve 20 ml vody a vypít. Suspenze má mírně vanilkovo-mandarinkovou příchutí.

Kontraindikace: Hypersenzitivita k amoxicilinu nebo k jakémukoli jinému beta-laktamovému antibiotiku. Hypersenzitivita k některé z ostatních složek přípravku. Pacienti mající současně i virovou infekci, zejména infekční mononukleózu, pacienti s lymfatickou leukémií. **Interakce:** probenecid, fenylbutazon, oxyfenbutazon a v menší míře kyselina salicylová, indometacin a sulfonpyrazon prodlužují polčas amoxicilinu v plazmě a zvyšují jeho hladiny. Souběžné užívání amoxicilinu s perorálními kontraceptivy může být spojeno se sníženou účinností kontraceptiva. **Nežádoucí účinky:** Poruchy kůže a podkožní tkáně: vyrážka, gastrointestinální poruchy: průjem, anální pruritus. **Upozornění:** zřídka může dojít i k závažným případům hypersenzitivity, léčba amoxicilinem musí být okamžitě zastavena. Při léčbě se mohou vyskytnout superinfekce. Při vzniku těžkého průjmu je třeba uvažovat o možnosti pseudomembranózní kolitidy. **Těhotenství a laktace:** Bezpečnost amoxicilinu v těhotenství a při kojení nebyla ověřena. **Velikost balení:** DUOMOX[®] 250:20 tbl, DUOMOX[®] 375:20 tbl, DUOMOX[®] 500:20 tbl, DUOMOX[®] 750:20 tbl, DUOMOX[®] 1000:14 nebo 20 tbl. **Poslední revize textu:** 12. 8. 2009. **Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci:** Astellas Pharma s. r. o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Česká republika. **Způsob výdeje:** Výdej je vázán na lékařský předpis. **Způsob hrazení:** Léčivo je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. **Registr, číslo:** 15/270/93-C.

Podmínky uchovávání: Při teplotě do 25 °C, uchovávat v původním vnitřním obalu.

Komplexní péče

Prémiová řada Sunaru inspirovaná mateřským mlékem báječně chutná a obsahuje všechny potřebné látky. Všechny nutriční složky jsou obsaženy ve vyváženém množství a optimálním poměru a jsou v souladu s nejnovější legislativou EU pro oblast dětské výživy.



Sunar complex 1 – od narození

Sunar complex 2 – od ukončeného 6. měsíce



Sunar complex 3 – od ukončeného 12. měsíce



Sunar 24 – od ukončeného 24. měsíce

7 dobrých důvodů pro prémiovou řadu Sunaru:

- Unikátní mléka Sunar complex a Sunar 24 obsahují nezbytné vitaminy, minerální látky a další nutriety.
- Obsahují obdobně jako mateřské mléko **prebiotickou vlákninu**.
- **Vitamin D, fosfor a navýšená hladina vápníku** jsou důležité nejen pro zdravý růst a vývoj zoubků, ale rovněž pro tvorbu kostní tkáně.
- **Vitamin A** má výrazné antioxidační účinky.
- **Maltodextrin** zvyšuje sytící schopnost a příznivě ovlivňuje chuť a vůni mléka.
- **Mléčný tuk** dodává mlékům Sunar lahodnou mléčnou chuť.
- **Ochucené varianty Sunaru** přispívají k poznávání a postupnému rozšiřování chutí dítěte.

I Vy můžete ovlivnit spokojený život dívek a mladých žen! Očkejte vakcínou SILGARD!®



Vakcína SILGARD® = prevence:

**CERVIKÁLNÍ
KARCINOM***

**GENITÁLNÍ
BRADAVICE***

**CERVIKÁLNÍ
DYSPLAZIE***

**VULVÁLNÍ
DYSPLAZIE***

**VAGINÁLNÍ
DYSPLAZIE***

* v příčné souvislosti s HPV typy 6, 11, 16 a 18

Zvažte přínos očkování pro Vaše pacientky do 45 let!

Zkrácené informace o léčivém přípravku:

Silgard® injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná), (Papilomaviri humani typus 6, 11, 16, 18 proteinum L1)

Indikace: Prevence premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních a vaginálních), cervikálního karcinomu a bradavic zevního genitálu (condyloma accuminata) v příčné souvislosti s lidským papilomavirem (HPV) typů 6, 11, 16 a 18. Indikace je založena na prokázané účinnosti u dospělých žen ve věku 16 až 26 let a na prokázané imunogenitě u 9 až 15letých dětí a dospívajících. Použití přípravku Silgard musí být v souladu s oficiálními doporučeními. *) **Kontraindikace:** Precitlivlost ke všem komponentám vakcíny, závažné akutní horečnaté onemocnění. **Dávkování:** Základní očkování – 3 samostatné 0,5 ml dávky podané dle následujícího schématu: 0, 2, 6 měsíců. Všechny dávky musí být podány intramuskulárně během jednoletého období. **Upozornění:** Pro případ vzácných anafylaktických reakcí musí být k dispozici odpovídající léčebná opatření. Vakcína není určena k léčbě, nenahrazuje rutinní cervikální screening. Jedinci se sníženou imunitní reakcí nemusí na vakcínu zareagovat. Podávat opatrně jedincům s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou koagulace. **Interakce:** Při současném podání s vakcínou proti hepatitidě typu B (rekombinantní) nedošlo ke klinicky významným změnám v imunitních odpovědích na obě vakcíny. Použití hormonální antikoncepce neovlivnilo imunitní odpověď. **Těhotenství a kojení:** Očkování odložit až na dobu po ukončení těhotenství. Může být podávána kojícím ženám. **Nežádoucí účinky:** Velmi často erytém, bolest a otok v místě injekce, pyrexie, často bolest v končetinách, zhmožděnina, podlitina a pruritus v místě injekce, vzácně kopřivka, velmi vzácně bronchospasmus. **Zkušenosti po uvedení přípravku na trh:** Protože tyto účinky byly hlášeny dobrovolně populací o neurčité velikosti, není možné spolehlivě odhadnout jejich četnost nebo potvrdit pro všechny účinky kauzální souvislost s podáním vakcíny. Lymfadenopatie, reakce precitlivlosti včetně anafylaktických/anafylaktoidních reakcí, syndrom Guillain-Barrého, závrat, bolest hlavy, synkopa, nauzea, zvracení, artralgie, myalgie, tělesná slabost, únava, malátnost. *) **Léková forma:** Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. **Uchovávání:** V chladničce (2 °C–8 °C), ve vnější krabici, chránit před mrazem. **Velikost balení:** 0,5 ml suspenze v předplněné injekční stříkačce se dvěma jehlami – balení po 1 kusu. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Merck Sharp & Dohme Ltd., Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Velká Británie. **Registrační čísla:** EU/1/06/358/003-021. **Poslední revize textu SPC:** 2/9/2009

*) Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.

Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku.

Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.



© Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.

© Copyright MERCK & CO., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A., 2009. Všechna práva vyhrazena.

MERCK SHARP & DOHME IDEA, Inc., org. sl., Křenova 5, 162 00 Praha 6, Tel.: +420 233 010 111, www.msdi.cz

* Affiliate of MERCK & CO., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.


SILGARD®

**Vakcína proti lidskému papilomaviru
[typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná)**



Zakousni se do života

Fenylalanin pod kontrolou

Myslíte si, že je důležité udržovat hladiny fenylalaninu v takovém rozmezí, aby nedocházelo k přechodným nebo trvalým následkům? KUVAN® je první a jediný v Evropě schválený lék na léčbu fenylketonurie účinně zaměřený na její příčinu^{1,3}. KUVAN® umožňuje optimální zvládnutí hladin Phe, pomáhá dosáhnout léčebných cílů^{4,5} a jeho bezpečnost byla pečlivě hodnocena v odborných studiích^{4,7}. KUVAN® může pomoci Vaším pacientům zakousnout se do života.

KUVAN®
saproterin dihydrochloride
Phe pod kontrolou

Zkrácená informace o přípravku

Název přípravku: Kuvan 100 mg tableta pro přípravu perorálního roztoku. **Složení:** Jedna tableta pro přípravu perorálního roztoku obsahuje 100 mg saproterinu dihydrochloridu (odpovídá 77 mg saproterinu). **Indikace:** Kuvan je indikován k léčbě hyperfenylalaninémie (HPA) u dospělých a dětí od 4 let věku s fenylketonurií (PKU), u kterých byla prokázána odpověď na tuto léčbu. Kuvan je také indikován k léčbě hyperfenylalaninémie (HPA) u dospělých a dětí s deficitem tetrahydrobiopterinu (BH4), u kterých byla prokázána odpověď na tuto léčbu. **Dávkování a způsob podání:** Léčba přípravkem Kuvan musí být zahájena a podávána pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou fenylketonurie a deficitu BH4. Kuvan by měl být podáván s jídlem v jedné denní dávce ve stejnou denní dobu, přednostně ráno. Při užívání přípravku Kuvan je nutné dodržovat dietní opatření ohledně příjmu fenylalaninu v potravě a celkového příjmu bílkovin pro zajištění odpovídající kontroly hladin fenylalaninu v krvi a nutriční rovnováhy. Úvodní dávka přípravku Kuvan u dospělých a dětí s fenylketonurií je 10 mg/kg tělesné hmotnosti v jedné denní dávce. Dávku upraví lékař obvykle v rozmezí od 5 do 20 mg/kg/den pro dosažení a udržení odpovídajících hladin fenylalaninu v krvi. Úvodní dávka přípravku Kuvan u dospělých a dětí s deficitem BH4 je 2 až 5 mg/kg tělesné hmotnosti v jedné denní dávce. Dávky mohou být upraveny až do 20 mg/kg/den. Pro optimalizaci terapeutického účinku může být nutné rozdělit celkovou denní dávku na 2 až 3 dílčí dávky, které jsou podávány v průběhu dne. Předepsaný počet tablet by měl být vložen do sklenice nebo šálku s vodou, kde se nechá rozpustit. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku. **Zvláštní upozornění:** Pacienti léčení přípravkem Kuvan musí dále dodržovat dietu bez obsahu fenylalaninu a musí podstupovat pravidelné klinické hodnocení. **Interakce:** Při současném podávání inhibitorů dihydrofolát reduktázy či látek vyvolávajících vazodilataci je doporučena opatrnost. **Těhotenství a kojení:** Použití přípravku Kuvan by mělo být zvaženo pouze pokud přísná dietní opatření nesnižují odpovídajícím způsobem hladiny fenylalaninu v krvi. Při předepisování těhotným ženám je nutná opatrnost. Kuvan by neměl být užíván během kojení. **Nežádoucí účinky:** bolest hlavy, rinorea, kašel, průjem, zvracení, abdominální bolest. **Držitel registračního rozhodnutí:** Merck KGaA, Darmstadt, Německo. **Uchovávání:** Uchovávejte při teplotě do 25 °C. **Velikost balení:** 1 lahvička obsahuje 30, 120 nebo 240 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. **Registrační číslo:** EU/1/08/481/001, EU/1/08/481/002, EU/1/08/481/003. **Datum revize textu:** 12/2008. **Výdej přípravku:** vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného pojištění. Před podáním léku si přečtěte úplné informace o přípravku.



KLACID® SR

originální klaritromycin

VHODNÝ / VÝHODNÝ

14

7



KLACID® 14/10/01/01

Zkrácená informace o přípravku: KLACID® SR. Složení: Klaritromycinum 500 mg v 1 tabletě s řízeným uvolňováním. **Indikace:** Infekce u dospělých a dětí od 12 let, vyvolané citlivými mikroorganismy: infekce horních a dolních cest dýchacích, infekce kůže a měkkých tkání. **Kontraindikace:** přecitlivělost na makrolidy, současné užívání tetracyklinu, astemizolu, disopiridu, pimozidu, ergotaminu a dihydroergotaminu, závažné renální postižení - zde lze podávat klaritromycin s okamžitým uvolňováním. **Zvláštní upozornění:** Opatrnosti je zapotřebí u pacientů s poruchou jater či ledvin. Existuje možnost zkřížené rezistence mezi klaritromycinem a ostatními makrolidy i linkomycinem a klindamycinem. Téměř u všech antibakteriálních léků byla popsána pseudomembranózní enterokolitis. **Těhotenství a kojení:** Bezpečnost během těhotenství a kojení nebyla stanovena. Klaritromycin se vylučuje do mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Nejčastěji poruchy zažívacího traktu, bolesti hlavy, puchýř v ústech a přechodné zvýšení jaterních enzymů. **Interakce:** Klaritromycin je primárně metabolizován cytochromem P 450. Klaritromycin např. zvyšuje hladinu perorálních antikoagulantů, digoxinu, theofylinu, karbamazepinu, atd. Ritonavir zvyšuje hladiny klaritromycinu. Současné podávání klaritromycinu s ergotaminem nebo dihydroergotaminem bylo spojeno s akutní námelovou toxicitou. Při současném užívání klaritromycinu a kolchicinu byla zaznamenána kolchicinová toxicita. **Dávkování:** Obvykle 1-2 tablety 1x denně s jídlem. Balení: 7 nebo 14 tablet po 500 mg. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Abbott Laboratories Ltd., Queenborough, Kent, Velká Británie. **Registrační číslo:** 15/062/98-C. **Podmínky uchovávání:** při 15°C-30°C, chránit před světlem. **Poslední revize textu:** 26.7.2006. **Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků zdravotního pojištění.** Dříve, než přípravek předepíšete, seznámte se, prosím, s úplnou informací o přípravku.

1. IMS data ČR 2009

ABBOTT LABORATORIES s.r.o.

Hadovka Office Park, Evropská 2590/33d
160 00 Praha 6

tel.: 267 292 111

fax: 267 292 100

www.abbott.cz




Abbott

A Promise for Life

Komfortní pomoc při nadýmání a dětských kolikách



**Praktické
dávkování**



Spolehlivost



Bezpečnost



Lefax suspenze. Účinná látka simethiconum.
Balení 50 ml.

Zkrácená informace o přípravku Lefax (perorální suspenze)

Název přípravku: LEFAX. **Složení:** Léčivá látka: Simethiconum. Lefax suspenze: 1 ml suspenze (2 stříky pumpou) obsahuje 41,2 mg Simethiconum. Seznam pomocných látek se nachází v úplném SPC. **Indikace:** Přípravek je určený pro symptomatickou léčbu: gastrointestinálních obtíží spojených s nadměrnou tvorbou plynů (meteorismus), tj. pocit nadýmání, tlak v epigastriu, případně postoperační tvorba plynů; funkční dyspepsie s potížemi: tj. pocit sytosti, tlak/bolest v epigastriu, nadýmání v epigastriu, nauzea, předčasný pocit sytosti, zvracení; symptomatická léčba dětské koliky; intoxikace detergenty. Používá se před vyšetřením ultrazvukem a RTG v oblasti břicha k redukci rušivých stínů plynů. **Dávkování a způsob podání:** Při gastrointestinálních potížích způsobených nadměrnou tvorbou plynů a při funkční dyspepsii. **Děti:** Doporučené dávkování pro novorozence a kojence do 1 roku jsou 1–2 stlačení (odpovídá 0,5–1 ml suspenze). Pro děti ve věku od 1 do 6 let je doporučená dávka 2 stlačení (odpovídá 1 ml suspenze) 3–5krát denně. Pro děti od 7 do 14 let, adolescenty a dospělé je doporučená dávka 2–4 stlačení (odpovídá 1–2 ml suspenze) 3–5krát denně. Při intoxikaci detergenty: Doporučená dávka pro děti je 2,5–10 ml (5–20 stlačení), **Dospělí:** Jako přípravek užívaný před diagnostickým vyšetřením. Lefax suspenze: (dospělí a mladiství) 3krát denně 4–6 stlačení den před plánovaným vyšetřením a 4–6 stlačení ráno v den vyšetření. Při intoxikaci detergenty: Doporučená dávka pro dospělé 10–20 ml (20–40 stlačení). **Způsob podání:** Pro perorální podání. Lefax suspenze musí být před použitím protřepána. Lefax by měl být užíván během jídla nebo po jídle, v případě potřeby před spaním. Pro kojence se suspenze může přidat do lahvi s mlékem. Kojící matky mohou lék kojencům podávat před kojením po lžičkách. **Interakce:** Nejsou známy. **Kontraindikace:** hypersenzitivita na simetikon nebo na jinou složku přípravku. **Nežádoucí účinky:** Lefax suspenze obsahuje kyselinu sorbovou, která může v některých případech způsobit kožní podráždění. **Těhotenství a kojení:** Lefax může být užíván během těhotenství a kojení. **Zvláštní upozornění:** Pacienti s perzistujícími abdominálními obtížemi by měli navštívit lékaře, aby se zjistila příčina obtíží, které by mohly signalizovat nějakou zásadní poruchu vyžadující léčbu. **Doba použitelnosti:** 2 roky. **Uchovávání:** Uchovávat při teplotě do 25 °C. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Bayer s.r.o., Praha, ČR. **Registrační číslo:** 49/317/97-C. **Datum revize textu:** 16. 11. 2005. **Přípravek je volně prodejný a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím se seznáme s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.**



**Malárie bere každý den život
více než 2700 dětem**

© Petr Ulrych, 2009

130 Kč = velká rodinná síť ošetřená prostředkem proti komárům

**Staňte se Přítelem dětí a pomozte nám zachraňovat dětské životy
stejně jako Patrik Eliáš, vyslanec dobré vůle UNICEF**

Registrace na **www.unicef.cz**

unicef 



Klinicky prokázaná funkce přináší vašemu dítěti v noci klidnější spánek

Spánek a výživa jsou životně důležité pro zdraví a štěstí vašeho dítěte. Hledání láhve, která významně redukuje koliku, ušlo dlouhou cestu k zajištění klidného nočního spánku pro vás oba. Ale kolika je jen část příběhu...

Neklid a podráždění jsou nejznámějšími projevy dětí při pláči – pravděpodobněji než u koliky. Je klinicky prokázáno, že pouze láhev na krmení Philips AVENT redukuje neklidné a podrážděné chování a pomáhá uklidnit vaše dítě, především v noci.*

Jedinečný pružný okraj dudlíku umožňuje při krmení proudění vzduchu do láhve a zamezuje vytváření vakua v láhvi.

Poslouchejte jemný, šumivý zvuk a sledujte vzduchové bubliny praskající na hladině mléka. To jsou důkazy toho, že vzduch proudí do lahvičky a nikoliv do břicha vašeho dítěte.

Stejně jako při kojení si vaše dítě samo kontroluje tok mléka a saje podobně jako z matčina prsu.

K dispozici jsou dvě nové řady láhví s 0 % BPA, ze kterých si můžete vybrat:

Extrémně trvanlivou, snadno čistitelnou, medově zbarvenou řadu láhví z materiálu PES (polyethersulfon) nebo měkkí, poloprůhlednou řadu láhví z látky PP (polypropylen) s unikátním těsnícím kroužkem.

U obou řad láhví je klinicky prokázáno redukování vzniku koliky**. Philips AVENT pomůže celé rodině k lepšímu spánku.

* Děti ve věku 2 týdnů krmené pomocí láhve AVENT vykazovaly méně neklidného podrážděného chování oproti dětem krmeným z jiné láhve.
** Děti ve věku 2 týdnů krmené pomocí láhve AVENT vykazovaly méně koliky oproti dětem krmeným z jiné láhve.



PES (polyethersulfon)



PP (polypropylen)

PHILIPS
AVENT

Výrobky Philips AVENT zakoupíte ve specializovaných prodejnách a v lékárnách.
Více informací: www.philips.com/AVENT nebo telefon 286 854 441 www.agssport.cz

NOVÁ ZDOKONALENÁ VAKCÍNA

Prevenar 13^{*}

Pneumococcal Polysaccharide Conjugate Vaccine (13-valent, Adsorbed)

Nejširší pokrytí
sérotypů mezi
pneumokokovými
konjugovanými
vakcínami.^{1,2,3}



Zkrácená informace o přípravku Prevenar 13 injekční suspenze. Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13-valentní, adsorbovaná).

Léčivá látka: Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje: Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 1* (2,2 µg), 3* (2,2 µg), 4* (2,2 µg), 5* (2,2 µg), 6A* (2,2 µg), 6B* (4,4 µg), 7F* (2,2 µg), 9V* (2,2 µg), 14* (2,2 µg), 18C* (2,2 µg), 19A* (2,2 µg), 19F* (2,2 µg), 23F* (2,2 µg). *Konjugován s nosným proteinem CRM₉₅ a adsorbován na fosforečnan hlinitý (0,125 mg). **Terapeutické indikace:** Aktivní imunizace k prevenci invazivních onemocnění, pneumonie a akutní otitis media, vyvolaných *Streptococcus pneumoniae* u kojenců a dětí ve věku od 6 týdnů do 5 let. **Dávkování a způsob podání:** Imunizační schémata přípravku Prevenar 13 by měla být založena na oficiálních doporučeních. Kojenci ve věku 6 týdnů – 6 měsíců: Tři dávky po 0,5 ml s intervalem nejméně 1 měsíc mezi dávkami. První dávka se obvykle podává ve věku 2 měsíců. Čtvrtou dávku se doporučuje podat ve věku mezi 11. – 15. měsícem. Dříve neočkovaní kojenci a děti ve věku ≥ 7 měsíců: Kojenci ve věku 7 – 11 měsíců: Dvě dávky po 0,5 ml s intervalem nejméně 1 měsíc mezi nimi. Třetí dávku se doporučuje podat ve druhém roce života. Děti ve věku 12 – 23 měsíců: Dvě dávky po 0,5 ml s intervalem nejméně 2 měsíce mezi nimi. Děti ve věku 2 – 5 let: Jedna samostatná dávka 0,5 ml. Očkovací schéma pro Prevenar 13 u kojenců a dětí dříve očkovaných přípravkem Prevenar (7-valentní) (*Streptococcus pneumoniae* sérotypy 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F a 23F): Kojenci a děti, u nichž bylo očkování zahájeno přípravkem Prevenar 13, nesmí být aplikován intravaskulárně. Tato vakcína nemá být podávána kojencům nebo dětem s trombocytopenií nebo s jinými poruchami koagulace, které jsou kontraindikací pro intramuskulární aplikaci, ledaže by potenciální přínos jasně převážil nad rizikem podání. Prevenar 13 chrání pouze proti těm sérotypům *Streptococcus pneumoniae*, které vakcína obsahuje a nechrání proti jiným mikroorganismům, které způsobují invazivní onemocnění, pneumonii nebo zánět středního ucha. Podobně jako jiné vakcíny nemůže ani Prevenar 13 ochránit všechny očkované jedince před pneumokokovým onemocněním. **Interakce:** Prevenar 13 může být podáván současně s jinými dětskými vakcínami podle doporučených očkovacích schémat. Různé injekční vakcíny musí být vždy podány každá do jiného místa vpichu. **Těhotenství a kojení:** Prevenar 13 není určen k podávání dospělým. Údaje o použití vakcíny u žen v průběhu těhotenství a kojení ani z reprodukčních studií na zvířatech nejsou k dispozici. **Nežádoucí účinky:** Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky patřily reakce v místě vpichu, horečka, podrážděnost, nechtivost, zvýšená spavost a/nebo nespavost. **Předávkování:** Předávkování přípravkem Prevenar 13 není pravděpodobné vzhledem ke způsobu balení v předpřehlé injekční stříkačce. **Uchovávání:** Uchovávejte v chladničce (2 – 8 °C). Chraňte před mrazem. **Balení:** 0,5 ml injekční suspenze v předpřehlé injekční stříkačce s pístovou zátkou a ochranným krytím hrotu. **Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci:** Wyeth Lederle Vaccines S.A., Rue de Bosquet, 15, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique. **Registrační číslo:** EU/1/09/590/001-6. **Datum poslední revize textu:** 5.12.2009. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. V současné době probíhá jednání o způsobu úhrady přípravku Prevenar 13 z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se, prosím, seznámte s úplnou informací o přípravku.

REFERENCE: 1. SPC Prevenar 13; 2. SPC Prevenar; 3. SPC Synflorix.

Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5
tel.: +420 283 004 111, fax: +420 251 610 270, www.pfizer.cz



Pracujeme společně pro zdravější svět™

www.pfizer.cz

www.prevenar13.cz

PRV-2010.0159

Pro klidné dětské bříško



Fructolax kids

doplňěk stravy

Přírodní přípravek s chutným
ovocným základem. Pomáhá
při potížích s vyprazdňováním.
Pro děti od 3 let.

ZAJISTÍME **ODBORNÉ AKCE** **pro lékaře a sestry**

kongresy | konference | semináře



kompletní servis včetně publicity...

**Interní
medicína
pro praxi**

**Pediatric
pro praxi**

**Psychiatrie
pro praxi**

**Neurologie
pro praxi**

**Medicína
pro praxi**

**Urologie
pro praxi**

**Intervenční
a akutní
kardiologie**

**Klinická
farmakologie
a farmacie**

Endoskopie

Onkologie

**Praktické
lékárenství**

**Dermatologie
pro praxi**

» www.solen.cz «

GENERÁLNÍ PARTNER

Váš partner v očkování



GlaxoSmithKline

HLAVNÍ PARTNEŘI

NUTRICIA



PARTNEŘI

Abbott Laboratories, s.r.o.

AGS sport, spol. s r.o.

APOGEPHA Arzneimittel GmbH

ASP CZECH s.r.o.

Astellas Pharma s.r.o.

BAXTER CZECH spol. s r.o.

BAYER s.r.o.

Beiersdorf spol. s r.o.

BIOVIT IMPEX CO.ČR, s.r.o.

Ceumed s.r.o.

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF

Danone a.s.

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Generica, spol. s r.o.

Grifols s.r.o.

GOLDIM spol.s r.o.

HERO CZECH s.r.o.

IPSEN PHARMA, organizační složka

Janssen-Cilag s.r.o.

LIFTEC CZ spol. s r.o.

MARK DISTRI, spol. s r.o.

MEDAC, spol. s r.o.

Medindex, spol. s r.o.

Merck Pharma k.s., divize Merck Serono

Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., organizační složka

MT–Makléř, s.r.o.

Novartis s.r.o.

Novo Nordisk s.r.o.

Občanské sdružení Výživa dětí

Pfizer, spol. s r.o.

Pharma Agency, s.r.o.

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o.

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

R-MARK s.r.o.

Sdružení celiaků České republiky

SPIRIG Eastern a.s.

Taktika, s.r.o.

TIMEScz s.r.o.

Zentiva, k.s.


SPONZOR COFFE BREAKU



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



ČESKO - SLOVENSKÁ
PEDIATRIE



- 1) Hotel **NH Olomouc Congress**
(lékařská sekce)
- 2) **Slovanský dům** (sesterská sekce)
- 3) Hotel **Sigma**
- 4) Hotel **Flora**
- 5) Hotel **SENIMO**
- 6) Best Hotel **Garni**
- 7) Hotel **V RAJI**
- 8) Penzion **Křivá**

- 9) Penzion **U Jakuba**
- 10) Hotel **LAFAYETTE**
- 11) Hotel **GEMO**
- 12) Hotel **ARIGONE**
- 13) Bar **LETADLO**
- 14) Hotel **ALLEY**
- 15) **Hlavní vlakové nádraží**

— Trasa z MHD (tramvaj nám. Hrdinů)

