

MICETAL

S: Flutrimazolum 10 mg v 1 g krému,
Flutrimazolum 10 mg v 1 g gelu,
Flutrimazolum 10 mg v 1 ml roztoku ve formě spreje.

IS: Antimykotikum.

CH: Flutrimazol je antimykotikum imidazolového typu. Interferuje se syntézou ergosterolu, což vede ke změnám v buněčných membránách hub.

I: Micetal krém a sprej: povrchové kožní mykózy (tinea, kandidóza, pityriáza).

Micetal gel: pityriasis capitis, seboroická dermatitida.

KI: Přecitlivělost na léčivou látku, na kteroukoliv pomocnou látku nebo na ostatní imidazolová antimykotika. Děti do 10 let.

ZU: Přípravek nesmí být aplikován na sliznice a do očí.

NÚ: Ojediněle zarudnutí nebo svědění v místě aplikace.

IT: Nejsou známy.

TL: V prvním trimestru těhotenství pouze v nezbytných případech, v době kojení je třeba opatrnosti.

D: Krém, sprej: 1x denně, nejlépe večer, po dobu 2-4 týdnů. Gel: 3x týdně po dobu 4 týdnů.

B: Krém 15 g, Sprej 30 ml, Gel 100 g.

Držitel registračního rozhodnutí: J. Uriach y Compañía, S.A., Španělsko

Datum poslední revize textu SPC: krém, sprej 27.4.2016, gel 22.12.2015

Micetal krém a sprej jsou vázány na lékařský předpis a jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Micetal gel není vázán na lékařský předpis a není hrazen zdravotními pojišťovnami.

Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).