

**Tab. 2.** Vliv léků z jiných indikačních skupin na farmakokinetiku fenytoinu (podle 10)

	vliv na fenytoin
acyklovir	↓ 71 %
alopurinol	↑ AUC 50–120 %, hladiny 26–37 %
amiodaron	↑ 3x
ciprofloxacín	↓ 80 %, může i ↑ nebo neměnit
cisplatina	↓ 78 %
dexametazon	↑ 30–50 %, nebo ↓ 38 %
diltiazem	↑ 90 %
disulfiram	↓ CL 66 %, ↑ t _{1/2} 73 %, ↑ hladiny 100–400 %,
flukonazol ^s	↑ 128 %, ↑ AUC 75 % (27)
fluoxetin	↑ 309 %
fluvoxamin	↑ 200 %
chloramfenikol	↑ 177 %
imipramin	68–100 %
isoniazid	↑ 3x u pomalých acetylátorů
itrakonazol	↑ AUC 10 %
karboplatina	↓ 50 %
klaritromycin	↑ 82 %
kotrimoxazol	↑ hladiny, ↓ CL 27 %, ↑ t _{1/2} 39 %
lopinavir + ritonavir	↓ AUC 31 %
metronidazol	↓ CL 15 %, může i ↑ nebo neměnit
mikonazol	↑ 50–181 %