

**Tab. 3.** Vliv fenytoinu na farmakokinetiku léků z jiných indikačních skupin podle (10)

	hladina	AUC	CL	t _{1/2}
9-aminokamptothecin	↓ 67 %		↑ 67 %	
amiodaron	↓ 32–49 %			
albendazol*	↓ 63 %	↓ 66 %		↓ 53 %
atorvastatin* (28)	↓ 24 %	↓ 54 %		
2-OH-atorvastatin	↓ 22 %	↓ 53 %		
4-OH-atorvastatin	↓ 52 %	↓ 44 %		
busulfan		↓ 16 %	↑ 19 %	↓ 23 %
cisatrakurium			↑ 25 %	
cyklofosfamid				
4-hydroxyfosfamid	↑ 6x	↑ 51 %		
cyklosporin	↓ 44 %			
dexamethazon			↑ 190 %	↓ 46 %
diazepam			↑ 158 %	↓ 62 %
N-desmethyldiazepam	↑			
digoxin	↓ 22 %	↓ 23 %		↓ 30 %
doxycyklin				↓ 52 %
etoposid			↑ 77 %	↓ 18 %
felodipin	↓ 82 %	94 %		
gefitinib (29)	↓ 26 %	↓ 47	↑ 126	
glufosfamid		↓ 15 %	↑ 15 %	
haloperidol	↓ 50–60 %			
chloramfenikol	↑ 15 %			↑ 14 %