

**Tab. 7.** Vliv valproátu na farmakokinetiku léků z jiných indikačních skupin

	hladina	AUC	CL
amitriptylin	↑ 19 %	↑ 30 %	
aripiprazol dehydroaripiprazol****	↑ 25 % ↑ 8 %	↑ 24 % ↑ 7 %	
bupropion hydroxybupropion	– ↑ 94 %		
irinotecan 7-ethyl-10-hydroxykamptothecin neaktivní glukuronid		↓ 46 % ↓ 46 % ↓ 33 %	
klozapin ⁺⁺⁺ N-desmethylklozapin	↑ 11–57 % i ↓ 15 % ↓		
kvetiapin ⁺⁺⁺	↑ 77 %		
lersivirin ^{SSSS}		↓ 25 %	
lopinavir		↑ 38 %	
lorazepam	↑ 31 %		↓ 31 %
naproxen		↑ 7 %	↓ 7 %
nimodipin		↑ 45 %	
nortriptylin		↑ 55 %	
olanzapin	↓ 18 %		
paklitaxel	↑ 40 %		↓ 23 %
zidovudin	↑ 100 %		

****předpokládaným mechanismem je indukce metabolismu aripiprazolu CYP3A4 a CYP2D6, nebo vytěsnění aripiprazolu z vazby na plazmatické bílkoviny

+++vlivem na CYP1A2 a CYP3A4

+++vliv na CYP3A4

SSSSinhibice UGT2B7