Závěr

Tento případ ukazuje raritně se vyskytující primární mucinózní adenokarcinom močového měchýře. U pacientů s adenokarcinomem močového měchýře se potýkáme s brzkou invazí do svaloviny močového měchýře. Metodou léčby je provedení radikální cystektomie s pánevní lymfadenektomií (5). Pokud pacient není ideálním kandidátem pro operační léčbu, je možné se přiklonit k primární radioterapii. Efekt léčby chemoterapií deriváty cisplatiny je nízký. Pokud není popsaná invaze do svaloviny močového měchýře, je možné provést kontrolní cystoskopii s eventuální resekcí recidiv, avšak u většiny pacientů se setkáváme s brzkou recidivou nebo lokální progresí onemocnění. Cílem sdělení je poukázat na vysokou zhoubnost tohoto vzácného histologického nálezu vyžadující rychlou reakci a multioborovou spolupráci.

LITERATURA

1. Roy S, Parwani AV. Adenocarcinoma od the urinary bladder. Arch Pathol Lab Med. 2011;135(12):1601-1605.
2. Wilson TG, Pritchett TR, Lieskovsky G, et al. Pimary adenocarcinoma of bladder. Urology. 1991;38:223-226.
3. Zhong M, Gersbach E, Rohan SM, et al. Primary Adenocarcinoma of the Urinary Bladder: Differential Diagnosis and Clinical Relevance. Arch Pathol Lab Med. 2013;137(3):371-381.
4. Wang HL, Lu DW, Yerian LM, et al. Immunohistochemical distinction between primary adenocarcinoma of the bladder and secondary colorectal adenocarcinoma. Am J Surg-Pathol. 2001;25(11):1380-1387.
5. Kaufman DS, Shipley WU, Feldman AS. Bladdercancer. Lancet. 2009;374(9685):239-249.

SOLEN
MEDICAL EDUCATION

Pro vás
a vaše pacienty
vysíláme
PODCASTY

NOVĚ:
Kdy nám zdravotní
a sociální systém podává
pomocnou ruku?

Medicínské informace ze Solenu můžete získávat
nejen v tištěné podobě, na kongresech nebo
z on-line kurzů, ale máme i podcastový kanál.

Více na **www.solen.cz**

V podcastových aplikacích hledejte HOVORY O MEDICÍNĚ